Captana Sapec 83

Fungicida preventivo de amplo espectro

Fungicida

CAPTANA SAPEC 83

SAPEC AGRO PORTUGAL

Tipo de produto: Fungicida
Composição: Pó molhável (WP)
c/ 83% (p/p) de captana
Família química: N-tiotrihalometilo (ftalimida)
Classificação Toxicológica: T
Classificação Ecotoxicológica: N
Número de APV: 1746
Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 200 g e 20 kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **CAPTANA SAPEC 83** é um fungicida de contacto com actividade preventiva no controlo de doenças de diversas culturas, com destaque para o pedrado das pomóideas.
- **CAPTANA SAPEC 83** estimula a vegetação, melhora o aspecto e coloração dos frutos, favorecendo a cicatrização de feridas provocadas por granizo.
- Apresenta actividade mesmo a baixas temperaturas.

OBSERVAÇÕES

- Precipitações iguais ou superiores a 20 mm são susceptíveis de lavar o produto.
- **CAPTANA SAPEC 83** não deve ser misturado com produtos alcalinos, nem com emulsões oleosas.

SAPEC AGRO PORTUGAL

ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PROBLEMA	CONC. g/hL	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS
Ameixeira	Crivado	180-240	1,8-2,4	Realizar aplicações imediatamente antes da floração, à queda das pétalas e 10 a 15 dias mais tarde. Repetir sempre que as condições climáticas favoreçam o desenvolvimento da doença.	21 dias
Amendoeira					14 dias
Damasqueiro					21 dias
Batateira	Míldio e Alternariose	180-240	1,8-2,4	A presistência biológica do produto é de 7-10 dias, devendo usar 7 dias no periodo de maior crescimento da cultura.	7 dias
Meloeiro	Antracnose, Alternariose, Cladosporiose e Septoriose	180-240	1,8-2,4	Realizar aplicações a partir da emergência enquanto o tempo decorra chuvoso.	28 dias
Morangueiro	Antracnose	200	2	Realizar a aplicação no início da floração e repetir, se necessário. A persistência biológica do produto é de 7 dias.	7 dias
Pereira e Macieira	Pedrado e Moniliose	180-240	1,8-2,4	Iniciar as aplicações ao aparecimento da ponta verde das folhas e repetir no estado de botão branco ou rosa. Os tratamentos durante a floração só serão efectuados em cultivares em que esta se prolongue por largo periodo de tempo ou perante condições climáticas favoráveis à evolução da doença. Repetir à queda das pétalas, ao vingamento do fruto. A persistência biológica do produto é de 10-12 dias.	21 dias
Pereira	Septoriose	180-240	1,8-2,4		
Tomateiro	Míldio, Alternariose, Cladosporiose e Septoriose	180-240	1,8-2,4	A presistência biológica do produto é de 7-10 dias, devendo usar 7 dias no periodo de maior crescimento da cultura.	14 dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos.
- As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.

Pedrado da pereira (frutos)

Pedrado da macieira (frutos)

Míldio do Tomateiro

Edição: F-CAP-01/13(FT) - A consulta do Manual SAPEC Agro não dispensa a leitura atenta do rótulo do produto.