

Fitanol®

Insecticida tratamento inverno



Tipo de produto: Insecticida

Composição: Emulsão água em óleo (EO)
com 80% (p/p) de óleo de verão

Família química: Hidrocarboneto

Classificação Toxicológica: Isento

Classificação Ecotoxicológica: N

Número de APV: 1646

Classificação ADR: 3082, 9, III



Embalagem: 1 L, 5 L, 20 L e 200 L

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ⊕ O **FITANOL®** é um insecticida que actua por contacto recomendado para tratamentos de Inverno contra formas hibernantes de insectos. Causa a sua morte por asfixia.

OBSERVAÇÕES

- ⊕ Não deve ser misturado com enxofre e captana. Deixar intervalar 3 semanas entre a aplicação deste produto e estas substâncias.
- ⊕ Nos tratamentos de Verão evitar as épocas de maior calor.
- ⊕ Deve utilizar-se pulverizações de alto volume e não usar atomizadores.



ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	CONC. L/hL	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS	PI
Citrinos	Cochonilhas	2	Aplicar só em cochonilhas jovens. Não aplicar desde a floração até os frutos atingirem o tamanho de uma noz. Não deve ser aplicado em plantas com sede. Aconselha-se uma rega na véspera.		
Cerejeira e Pessegueiro	Formas hibernantes de insectos e ácaros	4-5	Aplicações a serem feitas no estado fenológico A (repouso vegetativo).	-	✓
Macieira e Pereira			Aplicações a serem feitas no estado fenológico A (repouso vegetativo), embora o mais próximo possível do início do entumescimento dos gomos. Não dispensa normalmente os tratamentos do período vegetativo.		
Oliveira	Cochonilhas	1,5-2	Tratar no período de eclosão das larvas.		
Videira	Formas hibernantes de insectos, ácaros e cochonilhas	4-5	Tratar entre o entumescimento dos gomos e o estado de ponta verde.		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ⊕ Nos tratamentos de inverno utilizar a pulverização a alto volume e alta pressão molhando bem toda a planta.



Ovos



Ácaros



Cochonilha de S. José